

ВАКЦИНАЦИЯ в вопросах и ответах

Все о вакцинации в Санкт-Петербурге



ГЦМП

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР
МЕДИЦИНСКОЙ
ПРОФИЛАКТИКИ

covidspb.net

18+

Перед вакци

Какой вакциной

прививают петербуржцев?

Первая зарегистрированная в мире вакцина для профилактики коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вакс (Спутник V)» разработана «национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Д. Гамалеи». Вакцина получена биотехнологическим путем, при котором не используется патогенный для человека вирус SARS-CoV-2. Она представляет собой раствор для внутримышечного введения.

Вакцина состоит из двух компонентов – компонент I и компонент II. В состав компонента I входит рекомбинантный аденовирусный вектор на основе аденовируса человека 28 серотипа, несущий ген белка S вируса SARS-CoV-2. В состав компонента II входит вектор на основе аденовируса человека 5 серотипа, несущий ген белка S вируса SARS-CoV-2. Вакцина индуцирует формирование гуморального и клеточного иммунитета в отношении коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2. У аденовирусов, являющихся векторами, исключен ген репликации, таким образом сами векторы в организме привитого не размножаются.

Показания к вакцинации?

Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19) у взрослых старше 18 лет.

2

нацинацией

Постоянные

противопоказания

- ✓ гиперчувствительность (анафилактические реакции в анамнезе) к компонентам вакцины или вакцин, содержащих аналогичные компоненты;
- ✓ тяжелые поствакцинальные осложнения (анафилактический шок, тяжелые генерализованные аллергические реакции, судорожный синдром, температура выше 40 °C и т.д.) на введение компонента I вакцины.

Противопоказания на момент (в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности):

- ✓ беременность и период грудного вскармливания;
- ✓ возраст до 18 лет.

Вакцинация людей с иммунодефицитными заболеваниями и заболеваниями при которых проводится иммуносупрессивная терапия (онкологические заболевания):

- ✓ Безопасность и эффективность вакцины у этих групп людей не изучалась, в связи с чем, вопрос о вакцинации (попылениях) должен решаться комиссией.

Какая нужна подготовка?

Особой подготовки не требуется. К вакцинации допускаются лица, заполнившие Анкету пациента и не имеющие противопоказаний к вакцинации. Перед проведением вакцинации проводится обязательный осмотр врача с измерением температуры, сбором эпидемиологического анамнеза, измерением ситуации, НС, АД.

Временные

противопоказания

- ✓ острые инфекционные и неинфекционные заболевания;
- ✓ обострение хронических заболеваний.

Вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления от острой инфекции или начала ремиссии. При не типичных ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ – вакцинацию допускается проведение вакцинации после нормализации температуры.

Ситуации, не включенные в инструкцию к вакцине, которые необходимо учитывать, как временные противопоказания:

- ✓ контакт с больным Covid-19 или с положительным на это заболевание менее, чем за 14 дней до прививки (вакцинацию проводят после 14 дней от момента контакта);
- ✓ предшествующая плановая вакцинация (против гриппа, пневмококковой инфекции и т.д.), прививка от коронавирусной инфекции проводится через 1 мес.
- ✓ при перенесении острой инфекции (нормой) и 2 введением вакцины, второй компонент следует ввести с соблюдением интервала 21 день или, как можно быстрее, после выздоровления от острой инфекции.



аускультацией дыхательной и сердечно-сосудистой системы, осмотром зева и заполнением Формы информированного добровольного согласия.

Нужно ли проверять

уровень антител?

Нет, таких требований в инструкции к вакцине нет. Не договаривается к вакцинации переболевшим COVID-19 в последние шесть месяцев. Подходы к вакцинации таких граждан будут выработаны позже. Несмотря на то, что, по данным исследований, антитела у переболевших в легкой или умеренной форме зачастую пропадают уже через 4-5 месяцев, предполагают, что у них сохраняется Т-клеточный иммунитет, который продолжает защищать организм. Тем не менее, таким гражданам рекомендуется продолжать соблюдать защитные меры.

Какие побочные эффекты

могут быть?

Нежелательные явления, характерные для применения вакцины, выявленные в рамках клинических исследований, а также исследований других вакцин на основе аналогичной технологической платформы, бывают преимущественно легкой или средней степени выраженности. Они развиваются в первые-вторые сутки после вакцинации и проходят в течение 3-х последующих дней. Чаще другие могут развиваться кратковременные общие и местные реакции:

3

● **общие** - непродуктивный гриппоподобный синдром, характеризующийся ознобом, повышением температуры тела, артралгией, миалгией, истощением, общим недомоганием, головной болью;

● **местные** - болезненность в месте инъекции, гиперемия или отечность.

Рекомендуется назначение нестероидных противовоспалительных средств при повышении температуры после вакцинации. Реже отмечаются тошнота, диспепсия, снижение аппетита, иногда - увеличение регионарных лимфоузлов. У некоторых пациентов возможно развитие аллергических реакций.

В случае развития указанных или других симптомов в течение времени после первой прививки, необходимо сообщить об этом врачу перед введением второй дозы вакцины.

Как записаться на прививку?

Прививку можно сделать в поликлинике, к которой вы прикреплены: по вашему страховому полису. Если вы не знаете номер вашей поликлиники, то эту информацию можно получить на сайте: <https://krboms.ru> во вкладке Сервис.

После того, как вы узнали номер своей поликлиники можно записаться на вакцинацию через сайт «ГорЗдрав»: gorzdrav.ru

После записи сохраните на телефон или распечатайте электронный талон.

Если не удалось записаться онлайн, то можно записаться по следующим телефонам:

- ✓ Единая региональная информационная служба номер 122 или 8(812)246-5-122
- ✓ Телефон для записи на вакцинацию в Комитет здравоохранения Санкт-Петербурга 635-35-64

4

Для ускорения процесса вакцинации можно заранее распечатать и заполнить «Анкету пациента» и «Информированное согласие»



Анкета
пациента



Информированное
согласие



После вакци

Что такое этапы вакцинации?


Вакцинацию проводят в два этапа: сначала вводят компонент I (V1) в дозе 0,5 мл. Препарат вводят внутримышечно. На 21 (V1 + 3 дня) день вводят компонент II (V2) в дозе 0,5 мл. Препарат вводят внутримышечно.

После первой прививки (V1) вам сразу сообщат в какой день и время прийти на введение второго компонента (V2). Позже вам могут перезвонить и попросить прийти в другое время или другой день. Как правило, в первую половину дня делают V1, вторую половину V2.

Что делать, если заболел после первого компонента?

В случае заболевания Covid-19 между первой и вторым этапом вакцинации, последний не проводится. Полноценная повторная вакцинация рекомендуется согласно инструкции к вакцине, через 6 месяцев после выздоровления.

Если между первой и второй прививкой человек заболел острыми инфекционными и неинфекционными заболеваниями, вакцинация проводится через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии. При не тяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях желудочно-кишечного тракта вакцинацию можно проводить после нормализации температуры.



Единая база телефонов поликлиник города в которых можно сделать прививку. Ищите ближайшую для себя поликлинику.

Если у вас нет прописки в городе, можно привиться в живой очереди, которая есть в некоторых поликлиниках, записаться туда по телефону. Главное условие: наличие полиса ОМС и СНИЛС.

Какие документы взять с собой на прививку?

- ✓ Паспорт
 - ✓ Полис ОМС
 - ✓ СНИЛС
 - ✓ Сертификат о прививках (при наличии) - в него впишут прививку
- При записи через ГорЗдрав - распечатку электронного талона
- В поликлинику если у вас уже есть запись, вам нужно в Прививочный кабинет. Обязательно используйте маску.

В некоторых случаях сначала нужно взять номер в регистратуре.

Дополнительные рекомендации

При наличии контакта с больным COVID 19 прививку целесообразно проводить не ранее, чем через 14 дней после контакта

Если человек заболел после первой вакцинации «Гам-Ковид-Вак», дальнейшая вакцинация против COVID-19 проводится через 6 месяцев.

При вакцинации против других инфекций, вакцинация «Гам-Ковид-Вак» осуществляется через месяц, другие прививки можно проводить такие через месяц после введения второго компонента «Гам-Ковид-Вак»

Помните!

Верить стоит исключительно проверенным источникам!

Вакцинация от коронавирусной инфекции Covid-19 не дает гарантии от заражения коронавирусной инфекцией, но существенно снижает риски заболевания и его тяжелого течения.

Перед вакцинацией учитывайте возможные у вас противопоказания!

Какие возможны индивидуальные реакции на вакцину?

В большинстве случаев прививка хорошо переносится. Но и при недомогании волноваться не стоит. Это нормальная индивидуальная реакция организма на вакцину и один из признаков формирования иммунитета.

Возможные индивидуальные реакции, которые проходят в течение 1-3 дней:

слабость, недомогание, чувство усталости

тошнота

Рекомендации: увеличить физическую активность и дать себе отдохнуть. Не перегружаться и не ругать себя за то, что нет сил.

У 5,7% пациентов

температура выше 37,0°C

головные боли

линьота в теле и мышцах

чувство жара

6

Вакцинация

Рекомендации:
При температуре тела выше 38°C принять жаропонижающие и обезболивающие препараты (парацетамол или ибупрофен).
Если температура тела выше 39°C и не снижается в течение 4-х часов после приема медикаментов, необходимо вызвать врача.

У 4,7% пациентов
боль, зуд, отеки и покраснение в месте введения вакцины.

Рекомендации:
Как правило, лечения не требуется. Для уменьшения отека и дискомфорта можно принять антигистаминные препараты.

У 1,5% пациентов
боль и першение в горле, насморк и заложенность носа.

Рекомендации:
Полоскать горло, орошать антисептическими средствами, обильное теплое питье, использование назальных спреев.

Менее, чем у 1%
повышенное давление, учащенное пульса.

Что выдают после вакцинации?
После вакцинации выдается справка с указанием названия вакцины, даты, серии и дозы. Если есть прививочный сертификат, то данные вписываются в него. На данный момент прививочного паспорта на Гам-Ковид-Вак нет.

Предостережения
В течение 30 мин после вакцинации проси Вас оставаться в медицинской организации для предупреждения возможных аллергических реакций.

covidspb.net

ГЦМП ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

122
Единая региональная информационно-справочная служба

